

## Léčba diafyzárních zlomenin s ohledem na věk

5 letý pac. s dislok. frct. diafýzy femuru je indikován k :

- a/ otevřené repozici a OS
- b/ časně imobilizaci v SFO
- c/ trakční léčbě

Metodou volby pro diafyzární frct. dlouhých kostí u dětí je:

- a/ OS dlahou
- b/ OS šrouby
- c/ intramedulární OS

Otevřená frct. bérce Tscherne O.III je indikovaná k:

- a/ vnitřní osteosyntéze
- b/ zevnímu fixátoru
- c/ typ OS dle věku

Monteggia zlomenina I typu zahrnuje:

- a/ frct. ulny s luxací hlavičky radia
- b/ frct. radia s luxací dist. ulny
- c/ frct. obou kostí předloktí

Schedeho trakční léčba využívá

- a/ váhu těla
- b/ tah závaží
- c/ byla již opuštěna

Weberova trakční léčba se používá

- a/ u nejmladších
- b/ u starších dětí
- c/ byla již opuštěna

Potraumatický zkrat u mladých dětí:

- a/ je vždy nutno řešit operačně
- b/ většinou se sám upraví
- c/ nesledujeme

Zatížení růstové ploténky růst kosti do délky:

- a/ omezuje
- b/ potencuje
- c/ nemá žádný vliv

Hojení svalkem se týká:

- a/ primárního hojení
- b/ štěrbinového hojení
- c/ sekundárního hojení.

Pro dislokaci dist. metadiafýzy femuru se uplatňují zejména:

- a/ abduktory
- b/ adduktory
- c/ flexory

K čemu se používá dynamizace hřebu:

- a/ ke zpevnění OS
- b/ ke stimulaci hojení
- c/ k vyloučení nutnosti sádrového obvazu

Zajištěním hřebu se rozumí opatření proti silám:

- a/ osovým
- b/ kompresním
- c/ torzním

Metodou volby pro OS dlouhých kostí u dětí a mladistvých je:

- a/ OS hřebem
- b/ OS šrouby
- c/ OS Prevoty

Galleaziho zlomenina postihuje

- a/ ulnu nebo radius
- b/ radius s luxací dist. ulny
- c/ výhradně ulnu

Na zásobení kostní kompakty haverské kosti se zúčastňují převážně:

- a/ medulární cévy
- b/ cévy periostu
- c/ obojí přibližně stejně

Metodou volby pro diafyzární zlomeniny dospělých je OS:

- a/ neutralizační dlahou
- b/ hřebem
- c/ Prevoty