

Poranění měkkého kolene

Nejčastějším poraněním měkkého kolene je

- a) poranění zadního zkříženého vazů
- b) poranění menisku
- c) ruptura lig. patellae

Unhappy trias je

- a) poranění menisku, předního zkříženého vazů a mediálního kolaterálního vazů
- b) fract. patellae, poranění menisku a chondrální defekt patelly
- c) vícečetné poranění jednoho menisku

Steinmannův vyšetřovací manévr je pozitivní při

- a) ruptuře LCA
- b) ruptuře LCP
- c) poranění menisku

Ballotement patelly je známkou

- a) náplně kolenního kloubu
- b) fraktura patelly
- c) femoropatellárního impingementu

Nejčastěji dochází k poranění

- a) a. mediálního menisku
- b) b. laterálního menisku
- c) c. obou menisků

Abrupce intercondilické eminence se typicky vyskytuje

- a) u starších jedinců po 60 roce života
- b) u dětí
- c) u obézních pacientů

Abrupce intercondilické eminence u dětí je ekvivalentem poranění u dospělého

- a) zadního zkříženého vazů
- b) menisků
- c) předního zkříženého vazů

Ošetření poranění menisků se řeší nejčastěji

- a) konzervativně - fixací ortézou
- b) ASK operací / odstranění či sutura/
- c) transplantací

Mezi hlavní příznaky poranění menisků patří

- a) hemarthros
- b) bolesti při rotačních pohybech kolene
- c) drásoty

4-bodovou ortézou řešíme poranění

- a) menisků
- b) vazů
- c) chrupavky

Nález tukových kapének v hemarthros vzbuzuje podezření na

- a) poranění menisků
- b) poranění vazů
- c) osteochondrální frakturu

Nejčastějším mechanismem poranění menisků je

- a) přímý čelní úder
- b) torzní násilí
- c) přímý boční úder

Hlavní zobrazovací metodou ,pro diagnostiku poranění měkkého kolene je

- a) RTG
- b) CT
- c) MRI

Plastica LCA se nejčastěji řeší

- a) náhradou syntetickým materiálem
- b) náhradou autograftem , či allograftem
- c) se neřeší chirurgicky

Sutura menisku se provádí

- a) vždy
- b) v red-red zóně
- c) pouze do 20 let věku