

Traumatické luxace, pouřazové kloubní nestability

K traumatické luxaci dochází nejčastěji vlivem poranění:

- a) svalů a šlach v okolí kloubu
- b) stabilizačních vazů v oblasti kloubu
- c) poraněním chrupavky

Při luxaci ramenního kloubu je nečastější směr luxace:

- a) dorzálně
- b) ventrálně
- c) kraniálně

Při traumatické luxaci ramena dochází nejčastěji k poranění:

- a) glenohumerálních ligament a kloubního pouzdra
- b) zlomenině v oblasti hlavice humeru
- c) poškození rotátorové manžety

Příčinou traumatické luxace zpravidla není:

- a) přímé působení síly na kloub
- b) dlouhodobé přetížení kloubu při špatném stereotypu pohybu
- c) nepřímé působení síly na kloub

Správný postup při akutní luxaci kloubu:

- a) RTG diagnostika, repozice, fixace a RTG kontrola
- b) repozice a observace
- c) repozice a rehabilitace

Při rekonstrukci nestability kolenního kloubu nejčastěji používáme

- a) allogenní štěpy
- b) arteficiální náhrady
- c) autogenní štěpy

Chronická potraumatická nestabilita vede k následujícímu stavu:

- a) omezení funkce kloubu
- b) urychlení degenerace kloubu
- c) obojí výše uvedené

Při chronické nestabilitě kolenního kloubu nejčastěji rekonstruujeme

- a) přední zkřížený vaz
- b) zadní zkřížený vaz
- c) laterální kolaterální vaz

Riziko recidivující luxace kloubů

- a) stoupá s věkem
- b) klesá s věkem
- c) věk nemá vliv

U kterého kloubu je nejmenší riziko poranění okolních nervů

- a) ramenní kloub
- b) kyčelní kloub
- c) patellofemorální kloub

Nejzávažnější pro pacienta z hlediska možných komplikací je luxace

- a) ramenního kloubu
- b) interfalangeálního kloubu
- c) kyčelního kloubu

Při řešení pouřazové nestability se často využívají

- a) ortézy
- b) protézy
- c) epitézy

Traumatická ruptura vazů v oblasti kolenního kloubu je indikací k operaci

- a) vždy je nutno postupovat operačně
- b) nikdy, léčí se vždy konzervativně
- c) pokud má pacient klinické obtíže

Z hlediska pouřazové nestability a recidivující luxace je nejméně ohrožen

- a) ramenní kloub
- b) loketní kloub
- c) hlezenní kloub

Při řešení kloubních nestabilit nejčastěji využíváme tuto operační techniku

- a) artroskopii
- b) artrodézu
- c) alloplastiku