

Zlomeniny v oblasti kolenního kloubu

Konzervativní léčba zlomenin distálního femuru je

- a) a.častá
- b) b.na rozhodnutí lékaře
- c) c.zcela vyjímečná

Při operační léčbě intraartikulárních zlomen distálního femuru je kladen důraz

- a) a.na rotační postavení fragmentů
- b) b.anatomické postavení fragmentů
- c) c.na osovém postavení fragmentů

Užití zevní fixace je metodou volby u

- a) a) otevřených zlomenin
- b) b) zlomenin s výraznou devastací měkkých tkání
- c) c) zlomenin s masivním otokem

Který typ osteosyntézy není vhodný k ošetření zlomenin distálního femuru

- a) a.PFN
- b) b.DCS
- c) c.kondylární dlaha

Dislokací fragmentu při zlomeninách distálního femuru může dojít k poranění

- a) a.a.poplítea
- b) b.n.tibialis
- c) c.n.ulnaris

Zlomeniny pately se nejčastěji operují za pomoci osteosyntézy

- a) a.tahová cerkláž
- b) b.neutralizační dlaha
- c) c.úhlově stabilní dlaha

Patela bipartita je

- a) a.dvouúlomková zlomenina pately
- b) b.vrozená anomálie pately
- c) c.tříštvá zlomenina pately

Avulzní zlomenina interkondylické eminence tibiae se vyskytuje

- a) a.v dětském a dorostovém věku
- b) b.v dospělosti
- c) c.pouze u dívek

Při operační léčbě zlomenin distálního femuru v dětském věku nelze použít

- a) a.neutralizační dlahu
- b) b.Kirschnerovy dráty
- c) c.kondylární dlahu

Moorova klasifikace se týká

- a) a.zlomenin horního konce tibiae
- b) b.distálního konce femuru
- c) c.zlomenin pately

V operační léčbě intraartikulárních zlomenin horního konce tibiae se peroperačně využívá

- a) a.artroskopie
- b) b.RTG
- c) c.MRI

Metodou volby při operační léčbě zlomenin horního konce tibiae je osteosyntéza

- a) a.úhlově stabilní dlaha
- b) b.neutralizační dlaha

c) c.tahová cerkláž

Častým následkem zlomenin v oblasti kolenních kloubů je následná

a) a.artróza

b) b.nestabilita

c) c.osová deformita

Častou komplikací zlomenin v oblasti kolenního kloubu je

a) a.kompartment syndrom

b) b. tromboembolická nemoc

c) c.Sudeckův algodystrofický syndrom